



À transmettre aux patients ou à leur entourage lors de la prescription, de la dispensation ou de la surveillance d'un médicament

furosémide



Se lever très progressivement et rester quelques minutes à proximité d'un endroit où il est possible de s'asseoir ou de s'allonger. En cas d'étourdissement, s'asseoir ou s'allonger jusqu'à disparition des symptômes.

Pourquoi ? Ce médicament peut entraîner une baisse soudaine de la pression artérielle quand on passe rapidement de la position allongée à la position debout. Cette baisse soudaine cause des étourdissements ou des vertiges avec risque de chute qui surviennent parfois une à deux minutes après s'être levé. C'est surtout le cas quand on prend en plus d'autres médicaments qui abaissent la pression artérielle.



En cas de vomissements, de diarrhée, de transpiration importante liée à une fièvre ou à une forte chaleur, contacter un professionnel de santé.

Pourquoi ? Une perte d'eau trop importante altère le fonctionnement des reins, et donc freine l'élimination du médicament qui s'accumule dans le corps. Cela peut justifier de diminuer la dose ou d'arrêter le médicament temporairement. Des prises de sang permettent de surveiller le fonctionnement des reins.



Avant de prendre en plus un autre médicament, en parler avec un professionnel de santé.

Pourquoi ? La prise de certains autres médicaments augmente le risque d'effets indésirables, en particulier par mauvais fonctionnement des reins, ou par baisse du sodium ou du potassium dans le sang. C'est notamment le cas de certains laxatifs et des anti-inflammatoires (*ibuprofène* ou autres).

©Prescrire – novembre 2024

Sources • "Insuffisance cardiaque chronique" Premiers Choix Prescrire, actualisation novembre 2024.